治療(結腸切除術)

麻酔方法(

経過	術前1日目	(術前)	(術後)	手術後1日目	手術後2日目	手術後3日目	手術後4~8日目まで	手術後9~10日目まで
日時	( / )			( / )	( / )		( / )	( / )
	手術に関して理解できる 不安なく治療を受けること		合併症の出現がない 痛みがコントロールできる	消化管の症状・所見がない	`			退院後の生活に対する 不安がない
治療 処置 薬剤		術衣に着替えます。 浣腸をします 必要があれば、弾性ストッ	キングを履きます。 モニター・酸素をします。	。 主治医の診察があります。 傷口の観察をします。 痛みがある時は、痛み止め	♪の使用ができます		おなかの管を抜きます。	主治医の許可があれば、退院が可能になります。
検査		手術に必要な検査を行い	ます。 	採血をします。				
安静度	安静の制限はありません。	状態に合わせ手術室へ移	ベッド上安静です。	歩行できます。 最初の歩行は看護師が付	き添います。			
		食事はたべれません。 水分は主治医確認後とな	ります。	食事は食べれません。 水分は主治医の許可があ	れば摂取できます。		採血の結果をみて昼から	
清潔	おへそをきれいにする処	置を行います。   		清拭を行います。 —		<b>—</b>	おなかの管が外れたらシー	rワーができます。   
排泄	トイレまで歩行可能です。	手術の前までに排尿・排化	更を済ませておいてください 尿の管をいれます。	١,			トイレまで歩行可能です。	
教育	看護師からの事前説明が 術前オリエンテーションを 手術・麻酔の同意書にサ			があったらすぐにナースコー	ールを押してください。		腸の動きが良くなるように 積極的に動いてくださ い。 テいます	可能性がありますので 傷口は清潔に保ってくだ さい。
服薬指導	持参されたお薬の作用、	- 副作用について薬剤師が請		┗ び出た場合は、内服方法・	や作用・副作用について記	説明します。 🎤 🎉		傷口の発赤や発熱、腹 痛、食欲低下などの症
栄養指導			あり・	なし	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			州、長敏低下などの症 状がありましたら、次回
観察	腹部症状・不安の有無の		傷からの出血や性状を観体温や血圧等を測定しま 痛みや痺れなどを観察し	す。 — —				受診を待たずに受診し てください。
在宅復帰支援計画		安心して生活する為の支持できるような環境設定の		・療養にかかわるスタッフへ	指導します。			
主治医:		印		令和 年	月日日			

師 長:

本人または家族の承諾サイン:

担当看護師: 【在宅復帰支援担当者】津田 香月 【担当MSW】 4階北(香月) 5階北(緒方) 3階南(栗津) 4階南(増永) 5階南(中村)

【担当管理栄養士】 4階北(吉村) 5階北(松本) 3階南(吉村) 4階南(高宮) 5階南(高宮)

熊本セントラル病院

\*注:入院期間は、現時点で予測されるものである・病名等は現時点で考えられるものであり、今後検査などを進めていくに従って変わりうるものである

書式番号7005-2020